

Zuid - Oost Salland

Natuurlijk goed in de Regio!



Augustus

2026

Inhoudsopgave

Aan de leden en afnemers.....	3
Zakgoedroute.....	6
Nieuwe stikstofbrief: veel aangekondigd, nog weinig concreet.....	8
Effect van bestendig zetmeel en aminozuren in rantsoenen met laag ruw eiwit bij melkkoeien	10
Voeropname, melkproductie en efficiëntie bij Holstein versus Jersey- een meta analyse.....	12
Invloed van hittestress op klauwgezondheid en vruchtbaarheid	15
Export Nederlandse biggen en vleesvarkens naar Duitsland daalt fors.....	18
Groenbemester zaaien na de teelt van graan of “100” dagen maïs	20
Inkuilmiddel	22
Studiedag voor ondernemers in de intensieve veehouderij	24
Konijnenhouder Oonk viert veertigjarig jubileum, maar gaat bedrijf beëindigen	26
Gezocht: Allround medewerker melkveebedrijf (32 uur)	29
Actie van de maand	30

Aan de leden en afnemers

Op het moment van schrijven is de vakantie volop bezig. Tot nu toe hebben we een groeizaam seizoen gehad, maar de droogte begint inmiddels wel zijn tol te eisen. Er wordt overal volop beregend. Op Buienradar staat soms wel neerslag aangekondigd, maar die is al verdampt voordat de bewuste dag is aangebroken.

Vakantie hoort een periode van ontspanning en rust te zijn. Maar ons kabinet denkt daar weer eens anders over. Vlak voor de vakantie presenteerde ze hun plannen om het stikstofsloot mogelijk los te krijgen. Eigenlijk kun je het geen plannen noemen, maar eerder denkrichtingen. Want behalve de zones rondom natuurgebieden en de GVE norm per hectare, staat er nog weinig concreets in.

De GVE-norm zal bij menig boer kopzorgen veroorzaken. En als je binnen de zone rond een natuurgebied zit, vraag je je ook af wat de toekomst gaat brengen. Ook buiten deze zones zullen maatregelen genomen moeten worden, maar hoe deze er uit gaan zien weten we op dit moment nog niet. Zoals het kabinet zegt, gaan we van depositie naar emissiesturing en er zal fors gereduceerd moeten worden t.o.v. 2019. Een regering moet duidelijkheid geven, richting bieden en rust bewaren in het land, maar dat is in Nederland al jaren niet meer het geval.

Laten wij in ieder geval niet stoppen met iedereen te blijven wijzen op hoe onze landbouw is. Als je weer eens in gesprek bent met een burger, die geïnteresseerd is in het vak, merk je op zo'n moment dat er toch zeker waardering is voor ons vak.

Grondstofprijzen

De voortdurende oorlogen geven veel onzekerheid in de markten en laten de transportkosten door de duurdere olie fors stijgen. De vooruitzichten zijn niet goed. In alle conflicten in de wereld is er zeker geen eind in zicht.

Daarnaast blijft in Europa de droogte aanhouden en begint her en der ook zijn schade te eisen. De opbrengsten van gerst en tarwe vallen tegen en de vooruitzichten voor de maïsogst zijn ook niet

goed. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van granen en bijproducten de afgelopen dagen fors opgelopen. Het is nu afwachten wat de werkelijke opbrengsten van de oogsten wereldwijd zijn. Misschien vallen de uiteindelijke opbrengsten toch mee en is een correctie van de marktprijs naar beneden toch mogelijk. Ook de prijzen van eiwitproducten zijn hierdoor gestegen. Met name de hogere brandstofkosten beginnen hierbij hun invloed steeds duidelijker te laten zien. Gelukkig hebben wij behoorlijk veel in koop, waardoor de prijsstijgingen maar beperkt zijn terug te vinden in de voerprijs.

Beurs Hardenberg

Het duurt nog even, maar ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de RMV dagen in Hardenberg. Deze vindt plaats van 20 t/m 22 oktober, dus noteer deze data alvast in uw agenda.

Daarnaast is er ook dit jaar weer de vakbeurs voor de intensieve veehouderij. Deze vindt plaats op 14 en 15 oktober, dus noteer deze ook alvast in uw agenda.

Inname granen

Ook dit jaar neemt Zuid Oost Salland weer eigen verbouwd graan (tarwe, triticale, gerst, rogge en maïs) in via het z.g. poortwachter systeem. Wilt u hiervoor een graanverklaring van Zuid-Oost Salland ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Deze graanverklaring is noodzakelijk om de kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen en dient vóór aanvang van de oogst te worden geretourneerd. Onze adviseurs voeren hierop steekproefsgewijs controles uit.

Vakantiebestellingen

We hebben het er al eerder over gehad, maar brengen het graag nogmaals onder uw aandacht. Zoals ieder jaar gaan onze medewerkers – in de fabriek, op kantoor, de voorlichters en de winkel – om de beurt met vakantie, zodat wij u gedurende de vakantieperiode goed van dienst kunnen blijven.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om uw bestellingen tijdig door te geven. Op deze manier kunnen wij onze werkzaamheden en leveringen zo goed mogelijk blijven plannen en u de service bieden die u van ons gewend bent.

Daarnaast wensen wij u ook een goede en zonnige vakantie toe!

Hans Verheul



Zakgoedroute

We brengen de zakgoedroute graag nog even onder de aandacht.

De weken zijn als volgt ingedeeld:

- **Gebied 1:** de week met de 1^e van de maand
 - **Gebied 2:** de week met de 8^e van de maand
 - **Gebied 3:** de week met de 15^e van de maand
 - **Gebied 4:** de week met de 22^e van de maand
- Nb: De week loopt van maandag t/m zondag

Alle bestellingen die uiterlijk op **de vrijdag vóór** de betreffende leverweek zijn geplaatst én gedurende de hele week geleverd mogen worden, ontvangen:

- Bij bestellingen boven de EUR 250,-: **10** Euro korting per levering
- Bij bestellingen boven de EUR 1.000,-: **25** Euro korting.

Wij kunnen u vooraf een herinnering sturen via:

- E-mail;
- WhatsApp;
- Telefonisch (bellen).

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij ons kantoor

Bij spoedbestelling geldt een levertermijn van 3 werkdagen

Bestellingen vanaf **400 kg** worden gratis geleverd.

Op de volgende pagina vindt u de gebiedsindeling.

De zakgoedroutes zijn als volgt ingedeeld:

Gebied 1 Haarle/Holten

Balkbrug
Bergentheim
Borne
Bornebroek
Daarle
Dalmsholte
De Krim
Dedemsvaart
Den Ham
Drogeropslagen
Haarle
Heemserveen
Hellendoorn
Hoge Hexel
Hoogenweg
Lattrop

Lemele
Lemelerveld
Luttenberg
Marienberg
Nieuwleusen
Nijverdal
Ommen
Radewijk
Reutum
Saasveld
Slagharen
Vorden
Wierden
Witharen

Gebied 2 Heeten/Nw Heeten

Broekland
Heeten
Lierderholthuis
Marienheem
Nieuw- Heeten
Olst
Raalte
Wesepe
Wijhe

Gebied 3 Lettele/Averlo

Ambt-Delden
Bathmen
Bentelo
Colmschate
Deventer
Diepenheim
Diepenveen
Enter
Epse
Gelselaar
Goor
Gorssel
Harfsen
Holten
Joppe
Kring van Dorth
Laren
Lettele
Markelo
Notter
Okkenbroek
Rijssen
Schalkhaar
Zuna

Gebied 4 Zwolle/Dalfsen/Heino

Dalfsen
Hasselt
Hattem
Heino
Heino
Laag Zuthem
Mastenbroek
Oosterwolde
Wezep
Zalk
Zwartsluis
Zwolle

Nieuwe stikstofbrief: veel aangekondigd, nog weinig concreet

Op 26 juni heeft minister Jaimi van Essen (LVVN) de langverwachte stikstofbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze plannen wil het kabinet de vergunningverlening weer op gang brengen en Nederland uit het stikstofslot halen. Inmiddels heeft u hierover waarschijnlijk al het nodige in de media voorbij zien komen.

Veel plannen, nog weinig concreet

Hoewel de brief veel nieuwe plannen bevat, zijn de gevolgen voor de individuele veehouder op dit moment nog beperkt in te schatten. Veel maatregelen moeten de komende periode nog verder worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Daardoor is er op dit moment nog veel onduidelijk over wat de plannen in de praktijk gaan betekenen.

Emissieplafonds

Het kabinet wil emissieplafonds instellen voor de verschillende dierlijke sectoren. Voor de landbouw als geheel is het doel om de ammoniakuitstoot in 2035 met 42 tot 46% te verminderen ten opzichte van 2019. Mocht deze doelstelling niet worden gehaald, dan wordt als uiterste maatregel een generieke korting op productierechten in 2035 genoemd.

Beste beschikbare technieken

Voor de niet-grondgebonden veehouderij wordt gekeken naar een verplichte toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT). Het is echter nog niet duidelijk welke technieken hieronder gaan vallen en welke eisen straks aan bestaande stallen worden gesteld. Ook is nog onbekend welke bedrijven hun stallen moeten aanpassen en binnen welke termijn.

Zones rondom Natura 2000-gebieden

Daarnaast wil het kabinet zones van 500 of 1.000 meter instellen rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Binnen deze gebieden kunnen aanvullende regels gaan gelden. Vooral grondgebonden bedrijven lijken hiermee te maken te krijgen, maar ook voor andere veehouderijen kunnen de plannen gevolgen

hebben, bijvoorbeeld bij uitbreiding, verplaatsing of bedrijfsontwikkeling.

Afwachten op verdere uitwerking

De uiteindelijke gevolgen voor uw bedrijf zijn op dit moment nog niet te bepalen. Veel belangrijke onderdelen, zoals emissienormen, overgangsregelingen en eventuele ondersteuningsmaatregelen, moeten nog worden uitgewerkt.

Effect van bestendig zetmeel en aminozuren in rantsoenen met laag ruw eiwit bij melkkoeien

Voerstrategie bij daling van RE gehalte

Verlaging van ruw eiwit in rantsoenen is een van de effectiefste methoden om N benutting bij melkkoeien te verhogen en ammoniakemissie te beperken.

Op SFR zijn veel proeven uitgevoerd met dieren in begin, mid en eind lactatie waarin het effect van verlaging van ruw eiwit op voeropname en melkproductie zijn uitgetest. Op basis van de proefresultaten is het hieronder gegeven schema opgesteld voor voerstrategie bij verlaging van RE in het rantsoen. Hierin worden de gevolgen van het verlagen van ruw eiwit voor rantsoensamenstelling, voeropname, melkproductie, melkureum, N-benutting en ammoniakemissie in beeld gebracht.

Met iedere stap verlaging van ruw eiwit wordt de kwaliteit van het eiwit en de interactie met de energiestofwisseling belangrijker om voeropname en melkproductie op peil te houden (zie daarover hieronder meer). Bij een hoog RE gehalte in het rantsoen (> 175 g/kg DS) maakt de kwaliteit van eiwit niet zoveel uit: van alles is voldoende aanwezig. De verwachte N-benutting is laag, melkureum hoog en dit is het referentieniveau voor voeropname en melkproductie en ammoniakemissie. Bij daling van RE naar 160 g/kg DS is controle op dekking van normen voor WDVE en FEB voldoende om negatieve effecten tegen te gaan. Ammoniakemissie zakt dan met een geschatte 10%. Bij daling naar 150 g RE/kg DS is het belangrijk om de normen voor synchronisatie van eiwit en koolhydraatfermentatie en darmverteerbare aminozuren en glucogene nutrienten in acht te nemen. Uit onze proeven is gebleken dat dan een kleine daling (5%) van voeropname en productie niet aldoor vermeden kan worden. Bij een daling naar 145 g RE/kg DS rantsoen neemt het risico op verlaging van DS opname en melkproductie verder toe. In een van onze proeven hebben we getracht door middel van individuele eiwitvoeding op basis van

melkureumgehalte per koe en toepassing van een eiwitarme brok (bij hoog melkureum) of eiwitrijke brok (bij laag melkureum) de N-benutting te verbeteren, maar we vonden geen verschil ten opzichte van de controlegroep dieren die op één eiwitniveau gevoerd werden. In onderzoek op SFR en elders zijn ook de effecten van additieven op N-benutting onderzocht. Het werkingsmechanisme van additieven varieert van verhoging van eiwitbestendigheid (tannines), verlaging van de N verliezen in de pens en/of verhogen van de microbiele efficiëntie (saponinen, etherische oliën, gisten). De effecten van additieven zijn echter moeilijk te voorspellen en zijn daarom in de tabel tussen haakjes vermeld.

Effect van voerstrategie bij verlaging van ruw eiwit op voeropname, melkproductie, melkureum, N-benutting en ammoniak emissie.

Stap	RE (g/kg DS rantsoen)	Optimalisatie WDVE	Optimalisatie FEB	Synchronisatie RE/KH fermentatie	Darmverteerbare aminozuren	Glucogene nutriënten	Individuele voeding	Additieven	Verwachte N-efficiëntie	Voorpelde melkureum (mg/dl)	Verwacht effect op voeropname en	Verwacht effect op reductie NH ₃
0	>175								<25%	>25	0	0
1	160	X	X					(X)	30%	22	0	-10%
2	150	X	X	X	X	X		(X)	33%	16	-5%	-15%
3	145	X	X	X	X	X	X	(X)	35%	12	-10%	-17%

Bron: Schothorst Feed Research

Voeropname, melkproductie en efficiëntie bij Holstein versus Jersey- een meta analyse

Inleiding

Er zijn duidelijke verschillen in gewicht, droge stof opname, melkproductie, gehalten in de melk en voer- en N-efficiëntie tussen Holstein en Jersey melkkoeien. Een deel van deze verschillen kan gerelateerd worden aan verschillen in voeropnamegedrag en verteringsfysiologie. Zo spenderen Jerseys meer tijd aan voeropname en herkauwen ze intensiever per kg voer vergeleken met Holstein, resulterend in een hogere passage van voer door het maagdarmkanaal bij Jerseys. Jerseys hebben daardoor een lagere voerefficiëntie dan Holsteins bij ruwvoerrijke rantsoenen, maar een hogere voerefficiëntie bij krachtvoerrijke rantsoenen. Deze verschillen zijn vaak ontleend aan individuele studies.

In dit actueelbericht worden de verschillen tussen Holstein en Jersey in voeropname, melkproductie en efficiëntie verder in beeld gebracht aan de hand van een meta analyse van een grote database van proefgegevens (Almeida ea, 2026).

Resultaten

Voor deze studie zijn gegevens van 30 publicaties gebruikt waarin Holsteins met Jerseys vergeleken werden. De beide rassen werden onder gelijkwaardige omstandigheden gemanaged en gevoerd. In tabel 1 staan de verschillen samengevat. De gegevens bevestigen het beeld dat Jerseys minder DS opnemen en een lagere melkproductie met hogere gehalten aan vet en eiwit hebben. Opvallend is dat het lactosegehalte bij de Jerseys juist lager is. Uit de efficiëntieparameters bleek ook dat Jerseys een hogere voeropname en melkproductie hebben uitgedrukt per kg levend gewicht. De voerefficiëntie en N-efficiëntie zijn eveneens hoger bij Jerseys in vergelijking met Holsteins. Tevens hadden Jerseys een hogere verteringscoëfficiënt van NDF vergeleken met Holsteins. In de studie is verder onderzocht welke factoren van invloed zijn op de verschillen tussen Holsteins en Jerseys. Hieruit kwamen de volgende bevindingen naar voren:

- Jaar van publicatie: verschillen tussen Jerseys en Holsteins werden gunstiger voor de Jerseys naarmate de publicaties nieuwer waren. Dit duidt op een snellere genetische vooruitgang bij de Jerseys in vergelijking met de Holsteins.
- Dagen in lactatie: verschillen tussen Jerseys en Holsteins werden gunstiger voor Jerseys als dieren verder in lactatie kwamen. Jerseys zijn persistentere melkkoeien in vergelijking met Holsteins.
- Type ruwvoer in het rantsoen (zie tabel 1): de verschillen in productieparameters tussen Jerseys en Holsteins waren vaak groter op maissilagerijke rantsoenen in vergelijking met rantsoenen met veel luzerne, gras of klaver of ander ruwvoer. Het type ruwvoer had geen effect op de verschillen tussen de rassen voor wat betreft de meeste efficiëntieparameters.

Conclusie

Deze studie bevestigt de verschillen tussen Holsteins en Jerseys voor wat betreft opname, melkproductie en efficiënties. Jerseys nemen ten opzichte van Holsteins minder DS op, produceren minder melk met hogere gehalten (met uitzondering van lactose). Jerseys zijn beter dan Holsteins in melkproductie per kg gewicht, voerefficiëntie en vertering van NDF, maar niet in N-benutting.

De verschillen tussen de rassen zijn groter op maisrijke rantsoenen in vergelijking met rantsoenen op basis van luzerne/gras/klaver of overige ruwvoerders.

Tabel 1. Gemiddelde DS opname, melkproductie en efficiëntieparameters bij Holstein and Jerseys en het effect van het type ruwvoer in het rantsoen.

	Ras			Effect van type ruwvoer in rantsoen ¹		
	Holstein	Jersey	Verschil	Maissilage	Luzerne/gras/klaver	Overig
Productieparameters						
DS opname (kg/d)	21.0	16.8	-4.2	-3.5 ²	-2.5	ns
Gewicht (kg)	617	440	-169	-161	ns	ns
Melk (kg/d)	31.8	21.1	-10.8	-8.8	-5.1	-2.0
Vet (%)	3.72	5.33	+1.61	+1.31	+0.18	+0.52
Eiwit (%)	3.25	3.92	+0.69	+0.59	ns	+0.20
Lactose (%)	4.85	4.75	-0.09	-	-	-
Vet (g/d)	1161	1084	-62	ns	-137	ns
Eiwit (g/d)	1038	824	-211	-195	-107	ns
Lactose (g/d)	1715	1177	-584	-	-	-
FPCM (kg/d)	30.9	25.7	-5.1	-4.18	-4.16	ns
Efficiëntieparameters						
DS opname (% van LG)	3.43	3.83	+0.44	+0.27	ns	+0.21
FPCM (% van LG)	5.02	5.87	+0.64	ns	ns	+0.87
Voerefficiëntie (kg/kg)	1.45	1.51	+0.02	ns	ns	ns
N-efficiëntie (%)	27.9	27.7	-0.3	ns	ns	ns
VC-NDF (%)	55.8	57.7	+1.88	-	-	-

1 Aandeel van meer dan 55% in rantsoen DS

2 Getal geeft statistisch verschil tussen Holsteins en Jerseys op dit type rantsoen; ns = niet significant verschil tussen Holsteins en Jerseys op dit type rantsoen; - = niet getest

Bron: Almeida et al (2026). A meta-analysis and meta-regression to compare the production performance, feed efficiency, and milk N efficiency in Jersey versus Holstein cows. Journal of Dairy Science, in press.

Invloed van hittestress op klauwgezondheid en vruchtbaarheid

Hittestress heeft een belangrijke, maar vaak onderschatte invloed op de klauwgezondheid van melkvee. Bij hoge temperaturen passen koeien hun gedrag aan om overvloedige warmte kwijt te raken. Ze staan langer rechtop, zoeken verkoeling op harde vloeren of bij ventilatoren en brengen minder tijd liggend door. Door deze langere staatijd neemt de belasting van de klauwen toe, waardoor de kans op zoolbloedingen, zoolzweren en andere klauwaandoeningen groter wordt.

Daarnaast leidt hittestress vaak tot een verminderde voeropname en veranderingen in het rantsoengedrag. Koeien eten minder en vaker op verschillende momenten van de dag, wat het risico op pensverzuring (subacute pensacidose) verhoogt. Pensverzuring kan de doorbloeding van de klauwen verstoren en het hoornweefsel verzwakken, waardoor de kans op klauwproblemen zoals zoolzweren en witte lijn-afwijkingen toeneemt.

Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Tijdens warme periodes verzamelen koeien zich vaker rond drinkplaatsen en verkoelingssystemen, waardoor vloeren natter en vervuiler worden. Een vochtige en met mest verontreinigde omgeving bevordert de ontwikkeling van infectieuze klauwaandoeningen, zoals Mortellaro en tussenklauwontsteking.

De combinatie van een verhoogde mechanische belasting van de klauwen, veranderingen in de stofwisseling en een minder hygiënische omgeving maakt dat hittestress indirect een aanzienlijke negatieve invloed heeft op de klauwgezondheid. Effectieve maatregelen, zoals voldoende ventilatie, schaduw, koeling, onbeperkte toegang tot schoon drinkwater, een uitgebalanceerd rantsoen en een goede vloerhygiëne, kunnen het risico op zowel hittestress als klauwaandoeningen aanzienlijk verminderen. Daarnaast blijft regelmatig preventief klauwbekappen essentieel om problemen tijdig te signaleren en te voorkomen.

Hittestress heeft een grote negatieve invloed op de vruchtbaarheid van melkvee en kan leiden tot verminderde reproductieresultaten gedurende de zomermaanden en de periode daarna. Wanneer de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid hoog zijn, besteden koeien veel energie aan het afvoeren van overtollige lichaamswarmte. Hierdoor verschuift de prioriteit van het lichaam van productie en voortplanting naar het handhaven van de lichaamstemperatuur.


Een van de eerste gevolgen van hittestress is een verminderde bronstexpressie. Koeien vertonen minder duidelijke bronstverschijnselen, zoals onrust en bespringgedrag, waardoor bronstige dieren moeilijker worden herkend. Daarnaast duurt de bronst vaak korter en is de intensiteit lager, wat de kans op een juiste en tijdige inseminatie verkleint.

Ook de kwaliteit van eicellen en embryo's neemt af onder invloed van hittestress. Verhoogde lichaamstemperaturen kunnen de ontwikkeling van follikels verstoren en de kwaliteit van de eicellen verminderen. Zelfs wanneer bevruchting plaatsvindt, is de overlevingskans van het jonge embryo lager, waardoor meer vroege embryonale sterfte optreedt. De negatieve effecten van hittestress kunnen bovendien nog weken aanhouden, omdat de ontwikkeling van een eicel ongeveer twee tot drie maanden in beslag neemt.

Daarnaast beïnvloedt hittestress de hormonale regulatie van de voortplanting. De afgifte van hormonen die betrokken zijn bij de eisprong en het in stand houden van de dracht kan worden verstoord. Tegelijkertijd leidt de verminderde voeropname tijdens warme perioden tot een negatieve energiebalans, waardoor minder voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de reproductieve functies. Dit vertraagt het herstel van de vruchtbaarheid na afkalven en kan resulteren in een langere tussenkalftijd.

De gevolgen van hittestress zijn zichtbaar in lagere drachtigheidspercentages, een hoger aantal inseminaties per dracht en een langere interval tussen afkalven en succesvolle bevruchting. Deze effecten hebben niet alleen invloed op de technische resultaten van het bedrijf, maar brengen ook economische verliezen met zich mee door lagere melkproductie, hogere inseminatiekosten en een verminderde levensproductie van koeien.

Het beperken van hittestress is daarom essentieel voor een goede vruchtbaarheid. Maatregelen zoals voldoende schaduw, effectieve ventilatie, actieve koeling met ventilatoren en sprinklers, onbeperkte toegang tot schoon drinkwater en een uitgebalanceerd/energierijk rantsoen helpen de lichaamstemperatuur van koeien te verlagen. Door deze maatregelen tijdig in te zetten kunnen de negatieve effecten van hittestress op de reproductie aanzienlijk worden beperkt en blijven de vruchtbaarheidsprestaties beter behouden.



Export Nederlandse biggen en vleesvarkens naar Duitsland daalt fors



De export van Nederlandse biggen en vleesvarkens naar Duitsland is in de eerste zes maanden van 2026 flink teruggelopen. De uitvoer van vleesvarkens lag 9,8 procent onder het niveau van dezelfde periode in 2025. De biggenexport daalde met 6,6 procent.

Bij de biggen heeft Denemarken zijn voorsprong op de Duitse markt verder uitgebouwd ten opzichte van Nederland, meldt de Duitse belangenvereniging van varkenshouders ISN. De totale import van biggen kwam in het eerste halfjaar van 2026 uit op 4,87 miljoen dieren, een daling van 1 procent. Vanuit Denemarken gingen juist iets meer biggen naar Duitsland. De invoer uit dat land steeg met 0,3 procent naar 3,7 miljoen biggen.

De import uit Nederland liep terug met 6,6 procent tot 1,13 miljoen biggen. Hoewel de aantallen groot blijven, voert Duitsland ook zelf nog biggen uit. Die export nam met 22,4 procent af tot 400.000 dieren.

Duitsland importeerde in de eerste helft van dit jaar 349.638 vleesvarkens. Dat zijn er 56.414 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, oftewel een daling van 13,9 procent. De afname hangt samen met een lagere invoer uit Nederland en België.

Bijna 10 procent minder vleesvarkens

Uit Nederland daalde de import met 9,8 procent naar 260.000 dieren. Dat komt neer op ruim 25.500 vleesvarkens minder dan een jaar eerder. De terugval uit België was met 27,1 procent nog sterker, al ging het daar in absolute zin om een kleinere daling van ongeveer 13.500 dieren. De Belgische import kwam daarmee uit op 50.000 vleesvarkens.

Opvallend is dat de export van vleesvarkens vanuit Duitsland in het eerste halfjaar van 2026 met 1,9 procent toenam. In totaal werden 363.331 vleesvarkens uitgevoerd. Daarmee exporteerde Duitsland in die periode meer vleesvarkens dan het zelf importeerde.

Bron; Varkens.nl

Groenbemester zaaien na de teelt van graan of “100” dagen maïs

Voor de klanten die graan telen of van plan zijn de maïs te oogsten voor 1 september, en zo te voldoen aan de rustgewasverplichting, is het een goede mogelijkheid om te kiezen voor een ander vanggewas/groenbemester dan Italiaans raaigras of rogge. Omdat het zaaitijdstip nu op eind augustus komt te liggen is het een mooie kans om te kiezen voor akkerbouwmatige groenbemesters. Deze mengsels zijn erg goed voor de bodemvruchtbaarheid, onderdrukking van ritnaalden en tevens zijn deze mengsels niet winterhard en zodoende dus makkelijk zijn te bewerken in het volgende voorjaar.

Voor de GLB Eco-regeling zijn deze mengsels overigens ook gewoon toegelaten.

Deze mengsels kunnen gezaaid worden tot ongeveer half september, dus ook als uw “gewone” maïs zeer vroeg oogstrijp is, en u niet aan een rustgewasverplichting gebonden bent, kunt u gebruik maken van deze optie.

We hebben als Zuid Oost Salland zelf het mengsel Topsoil Structuur beschikbaar. Dit is een mengsel van Bladrammanas, gele Mosterd, Lupinen en Boekweit.

Maar uiteraard kunnen we ook alle andere groenbemesters leveren, zowel BCA1 / BCA2 of multiresistente groenbemesters indien gewenst.

Voor advies over welk mengsel voor u het meest geschikt kunt u contact opnemen met ons.



Zuid - Oost Salland

Natuurlijk goed in de Regio!

Z.O.S. Topsoil structuur

Groenbemestermengsel met krachtige bodemvoordelen



Diepe en diverse
beworteling




Stikstofbinding
door lupine



Bodembescherming
en structuur



Biodiversiteit &
bestuivers



DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- ✓ Verbeterde bodemstructuur door diepe en verschillende wortelgroei
- ✓ Meer organische stof en betere bodemvruchtbaarheid
- ✓ Stikstofbinding door lupine – minder behoefte aan kunstmest
- ✓ Aaltjesonderdrukkend (gele mosterd)
- ✓ Onderdrukt onkruid en beschermt tegen erosie
- ✓ Verhoogt biodiversiteit en trekt nuttige insecten aan
- ✓ Zorgt voor een gezonde bodem en hogere opbrengsten in de volgende teelt



TE ZAAIEN NA
DE TEELT VAN
GRANEN



OF NA
100 DAGEN
MAIS



ZAAIADVIES

- Zaaitijd: juli tot half september
- Zaaizaad: 20 – 25 kg/ha
- Zaaidiepte: 1 – 2 cm



Een krachtig mengsel van vier
complementaire groenbemesters
voor een vruchtbare, weerbare en
levendige bodem.

INVESTEER IN UW BODEM,
PLUK DE VRUCHTEN MORGEN!

Inkuilmiddel



Inkuilmiddelen pH



In de stal, is de kwaliteit van het basisvoeder overduidelijk de sleutel naar succes. Dat geldt niet enkel voor de productiviteit van de dieren, maar ook hun gezondheid. Met **harvest INTERNATIONAL® duo s, plus en pH** wordt het inkuilproces gericht gestuurd en de silage, in zijn kwaliteit, verbeterd.

Het natuurlijke aandeel van melkzuur-producerende micro-organismen is afhankelijk van het klimaat en verschilt van oogst tot oogst. Zo is er altijd de vraag of melkzuur-producerende microben correct zullen functioneren bij een veelvoud van andere microben en of de fermentatie zal slagen. Alleen door de opbouw van melkzuur kan de pH-waarde dalen.

Hoe sneller de pH-waarde zakt, hoe vroeger de microbiologische activiteit in de kuil zal stoppen. Het verlies van voedingsstoffen zal zo beperkt worden. De verliezen verminderen en er blijft gewoonweg meer van de ingekuilde DS over en daarin zitten natuurlijk de meest waardevolle voedingsstoffen, zoals suiker en eiwit.



harvest INTERNATIONAL® duo s

fermentatie en stabiliteit
na het openen

zakje van 200 g
voldoende voor
100 t silage



☒ DE-ÖKO-006,
FiBL-lijst
mag in de biologische
productie worden gebruikt
overeenkomstig de
verordening (EG) nr. 2018/848



harvest INTERNATIONAL® plus

aandachtspunt stabiliteit

zakje van 100 g
voldoende voor
100 t silage



KATEGORIE 2
**KONTINUÛERLIJCH
GEPRÜFT**
DLG-Zertifikat 6488



harvest INTERNATIONAL® pH

aandachtspunt fermentatie

zakje van 75 g
voldoende voor
50 t silage



KATEGORIE 1b, 4a, 4b, 4c (Milk)
**KONTINUÛERLIJCH
GEPRÜFT**
DLG-Zertifikat 6489

Gebruiksaanwijzing

harvest INTERNATIONAL® inkuilmiddel

Het gevriesdroogde poeder wordt in water opgelost en met het geschikte doseersysteem gelijkmatig op de silage verdeeld.

Dit mengsel moet binnen 48 uur gebruikt worden.

Houdbaarheid

18 maanden na de fabricatie (DOM)

bij ≤ 22 °C.

Gebruiksaanbeveling

harvest INTERNATIONAL®		duo s	plus	pH
	gras: < 30 % DS of vervuild			✓
	gras: > 30 % DS, groene roggen	✓		
	gras: > 30 % met veel suiker	✓	(✓)	
	maïs: < 35 % DS	✓	(✓)	
	maïs: > 35 % DS	(✓)	✓	
	granen-GPS	✓		
	klaver, luzerne			✓

Studiedag voor ondernemers in de intensieve veehouderij



Afgelopen 7 juli hebben wij onze studiedag gehouden voor onze afnemers van de intensieve veehouderij bedrijven. We hadden 's morgens eerst een rondleiding bij de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen. Hier werd de verwaarding van hoofdzakelijk vleesvarkensmest naar bruikbare eindproducten uitgelegd zoals gas en mineralen meststoffen. Ze zijn hier in staat om zelf het vocht uit de mest als wettelijke loosbaar water te leveren aan het oppervlakte water.



Na de middaglunch gaven we een presentatie verzorgd door Huub Derix van Koudijs over voer efficiëntie met als doel: hoe beter de voer efficiëntie, hoe minder mest je overhoudt. Het samenspel van de juiste voersoorten in combinatie met het juiste voerschema zorgt mede voor de optimale voer efficiëntie, hierbij is het van belang dat je de werkelijke voeropname van de dieren weet.



Konijnenhouder Oonk viert veertigjarig jubileum, maar gaat bedrijf beëindigen



VRAGENDER - Konijnenhouder Henk Oonk viert het veertigjarig bestaan van zijn onderneming. “Maar 41 jaar komt er niet”, zegt hij. Want het komende jaar beëindigt hij zijn agrarische bedrijf. Een opvolger is er niet en hij kan gebruikmaken van een opkoopregeling. Maandag ging hij met familie, bekenden en (oud-)werknemers de lucht in met zes luchtballonnen om het jubileum te vieren.

Henk komt uit een veeteeltfamilie. “Mijn vader werkte daarnaast bij de provincie; hij was een hobbyboer. Aanvankelijk wilde ik ook een veeteeltbedrijf, daar heb ik een opleiding voor gevolgd, maar het bedrijf van mijn ouders was met drie hectare te klein.” Dus werden het konijnen. Na een stage bij een bedrijf in Brabant begon Henk op 1 juni 1986 zijn eigen konijnenhouderij. Aanvankelijk in een stal van de burens, maar vanaf 1988 op de ene hectare die hij van zijn vader kreeg.

Van 60 naar 1800 naar 1500

Begonnen met 60 voedsters (vrouwjeskonijnen die geschikt zijn voor de voortplanting) breidde het bedrijf gestaag uit. In 1990 ging het aantal voedsters in één keer van 600 naar 1100. “Het afmesten gebeurde buiten in sheds”, herinnert hij zich. In 2006 werden de

huidige stallen in gebruik genomen. “Een miljoeninvestering die samenging met een uitbreiding naar 1800 voedsters. Sinds 2022 zijn dat er 300 minder, vanwege strengere regels.” Daarnaast investeerde hij veel in duurzaamheid, zoals zonnepanelen, warmte-koudeopslag en warmteterugwinning.

Vervelende herinneringen

Oonk kijkt met een goed gevoel terug op zijn leven als konijnenhouder, al zijn er ook vervelende herinneringen. “In oktober 2019 was er een insluiping door dierenactivisten. Dat heeft veel impact gehad. Ook vanwege het gevaar dat ze ziekten kunnen overbrengen. Natuurlijk mogen mensen vinden wat ze willen, maar ik beschouw het als mijn plicht om goed voor de konijnen te zorgen.” Een konijnenziekte dwong hem en zijn vrouw in 2022 tijdelijk op een nabije varkenshouderij te gaan werken.

Van konijnen naar huizen

Op bijna 63-jarige leeftijd werkt Henk nu toe naar zijn laatste maanden als konijnenboer. “Ik maak vrijwillig gebruik van de opkoopregeling — vrijwillig tussen aanhalingstekens. Maar wie weet hoe het over een paar jaar is. Een deel van de vergoeding heb ik nodig voor het afbreken van de stallen. Daarnaast heb ik toestemming om op mijn terrein drie bouwkvavels te realiseren. Met een onderlegger (juridisch: kettingbeding ME) zodat kopers, nu en in de toekomst, geen bezwaar kunnen maken tegen agrarische activiteiten in de omgeving.”

Boer zocht boer

Toch was hij in zijn hart het liefst nog een aantal jaren doorgedaan, om het bedrijf daarna over te dragen aan een opvolger. “Ik heb nog geadverteerd met als motto: boer zoekt boer. De vroege pensionering zal wel een gat zijn, maar het opleveren van de kvavels en huizen zal me afleiden en bezighouden. Het stoppen raakt niet alleen mij, maar ook mijn vrouw die meewerkt en zo’n dertien mensen die indirect voor het bedrijf werken.”

Angst voor kweekvlees

Hoe ziet hij de toekomst van de agrarische sector? “Zwaar. De stikstofregels, waar ik vaak tegen heb geprotesteerd, zijn te streng en boeren worden er onevenredig door getroffen. Voor vega-vleesvervangers ben ik niet bang, maar wel voor kweekvlees. Dat is

nu nog veel te duur, maar hoe lang nog? Voor veel boeren gaan de veranderingen te hard; het is hun leven.”

Herinneringen op hoogte

Oud-werknemers en bekenden kregen op de jubileumdag vanuit een luchtballoneen uitzicht over het bedrijf, praatten bij en haalden herinneringen op. Zoals Bert Grevers: “In de veertig jaar dat Henk konijnenboer is, ben ik heel wat jaren betrokken geweest. Ik heb het bedrijf groter en moderner zien worden, van de tijd dat bijna alles met de hand ging tot nu met de voermachine.”

Suzanne Hiddink: “Ik heb in de beginjaren negentig heel wat uurtjes in de konijnenschuur gewerkt. Iedere zaterdagochtend op de fiets samen met Inge richting familie Oonk. Na de middag hielp ik vaak Mien in de huishouding en ook regelmatig opa en oma Westerveld. Mien zorgde altijd voor koffie met ontbijtkoek en tussen de middag was er warm eten; wie aan het werk was, at mee.”

Broer Jan Oonk: “Toen het bedrijf echt ging groeien, heb ik mij langzaam teruggetrokken en had Henk veel steun aan Elizete. Die steun was zeker nodig nadat zijn vader in 2005 overleed. Henk sr. was zijn maatje; samen gingen ze ervoor, met ondersteuning van mama, die altijd klaarstond. Nu er geen opvolger is en de kans voorbij komt om na veertig jaar te stoppen, is Henk realistisch genoeg om die kans niet voorbij te laten gaan, ook al gaat het tegen zijn principes in. Eens een boer, altied een boer.”

Bron; Groenlose gids

Gezocht: Allround medewerker melkveebedrijf (32 uur)

Voor een melkveebedrijf in de omgeving van Haarle wordt een allround medewerker gezocht voor 32 uur per week, ook voor in het weekend.

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden op het melkveebedrijf.

Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen met Ronald Brandwagt via **06-46074088**.

Zuid - Oost Salland

*Natuurlijk goed en altijd
scherp in diervoeders*

Ruitensproeier anti-insect



5 liter

~~5,99~~
3,99

Bezem met steel



Bezem
29 cm

Steel
150 cm

~~12,95~~
9,95

Wespenvanger



VespaNo

~~10,95~~
8,95

Timo pensstaafjes



Hondensnack
1 kg rund

~~11,75~~
9,95

Dorpsstraat 51 Heeten
0572-381 541

Stationsweg 4 Haarle
0548-595 662

Insecten & wespenspray



400 ml

~~12,45~~
9,95

Visnet bamboe



110 cm

1,75

Autoshampoo



Dunlop
1 liter

3,95

Culterra Groen



NPK 10-4-6
25 kg

29,95

www.zuidoostsalland.nl

Winkel Heeten

ma t/m vrij 08.30 - 18.00 uur

za 08.30 - 16.00 uur

Zo gesloten

Kantoor Haarle

07.30 - 16.30 uur

gesloten

gesloten